


خریبوز

اور

تریبوز

پیداواری پروگرام



ساتبان زرعی مراکز پر دستیاب



ساتبان

MELON & WATER

مندرجہ ذیل ادویات خربوزے کو روئیں دار پھپھوند سے تحفظ دیتی ہیں۔

بونٹ™ 72 فیصد بایو پی



- بونٹ دوطاقتور پھپھوند کش ادویات پر مشتمل ایک بہترین پھپھوند کش۔
- بونٹ پھپھوند کے نظام تنفس اور پروٹین بنانے کے عمل میں رکاوٹ ڈال کر بیماری پھیلانے والے سپورز کا مکمل خاتمہ کرتا ہے۔
- بونٹ حفاظتی اور معالجاتی استعمال۔
- بونٹ پتوں، شاخوں اور جڑوں کے ذریعے جذب ہونے کی صلاحیت۔

سفارشات برائے استعمال

مسئلہ	حل	دوا کی مقدار	وقت استعمال
روئیں دار پھپھوندی	بونٹ	250-300 گرام فی ایکڑ	ہوا میں زیادہ نمی یا بارش کے بعد

ویلڈن™ / گلیمر™ 70 فیصد بایو پی



- پودوں میں مکمل سرائیت پذیر ہونے کی صلاحیت
- فصل کیلئے بالکل محفوظ
- حفاظتی اور معالجاتی جیسی بہترین صلاحیت

سفارشات برائے استعمال

مسئلہ	حل	دوا کی مقدار	وقت استعمال
جڑ اور تنے کا گھاؤ	ویلڈن یا گلیمر	400 گرام فی 100 لیٹر پانی میں 400-600 گرام فی 100 لیٹر پانی میں	بیماری کی علامات نظر آنے پر

نوٹ: بیماریوں کی بہترین تحفظ کیلئے اسپرے ایک ہفتے کے وقفے سے دو ہر انہیں۔


کیڑوں سے انسداد:

مسئلہ	حل	دوا کی مقدار	وقت استعمال
چور کڑا (Cut Worm)	چیزل یا ٹاکر	1000 ملی لیٹر فی ایکڑ 800 ملی لیٹر فی ایکڑ	آب پاشی کے دوران پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کریں
لال بھونڈی	سارجنٹ یا لائسنسیر	125 ملی لیٹر فی ایکڑ 80 ملی لیٹر فی ایکڑ	اسپرے کریں۔
لیف مائنر	سارجنٹ	125 ملی لیٹر فی ایکڑ	اسپرے کریں۔
تھرپس اور جوئیس	جولٹ	100 ملی لیٹر فی ایکڑ	اسپرے کریں۔
پھل کی کھچی	فروٹیکس	250 گرام فی 100 لیٹر پانی میں	اسپرے کریں۔

مزید معلومات اور راہنمائی کیلئے اپنے قریبی ساتبان زرعی مرکز سے رابطہ کریں۔

برائے رابطہ:

حیدر آباد	0300-8374899	رحیم یار خان	0301-8488647	مٹان	0301-8488142
ساہیوال	0301-8488643	لاہور	0300-0402673	دہلی	0302-8476389
کوئٹہ	0307-4443260	سکھر	0301-3568369	مروان	0307-4443522



ساتبان انٹرٹینشنل 62 کلومیٹر ملتان روڈ، روہی تالہ، پھول نگر، لاہور۔

saybangroup Web: https://www.saybangroup.com Ph: 049-4388444-6

بائیوٹاک خربوز اور تربوز کی کوئی کوہتر کرتا ہے۔

بائیوٹاک میں ڈالے گئے مائیکروبیائیڈز پودوں میں بیماریوں کے خلاف دفاعی نظام میں اضافہ کرتے ہیں۔

سفارشات برائے استعمال



نقص	مقدار فی ایکڑ	وقت اور طریقہ استعمال
خربوز یا تربوز	200 گرام کا ایک پیکٹ 100 لیٹر پانی میں	پودے اگنے کے 15 دن بعد پہلا سپرے، نئے ٹکڑے بھونٹے وقت دوسرا سپرے، پھل بننے کے وقت تیسرا سپرے، پودے کو پھلنے اور تنے سمیت پھلے کریں۔ شدید بیماری کی صورت میں ہفتے کے وقفے سے 3 مرتبہ سپرے دہرائیں۔

بیج کی زہر پاش:

خربوزے کو بیماریوں سے بچانے کیلئے بیج کی زہر پاشی ضروری ہے۔ گلیمر بیج کی زہر پاشی کیلئے ایک بہترین دوا ہے۔

بیماریوں کا حملہ اور ان کا انسداد:

1- روئیں دار پھپھوندی: (Downy Mildew)

بارش کے بعد یا ہوا میں زیادہ نمی کی وجہ سے یہ بیماری خربوزے پر حملہ آور ہوتی ہے۔ بارش کے پانی اور ہوا سے یہ بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ روئیں دار پھپھوندی کی علامات پتے کے نچلے حصے پر جو کہ زیادہ واضح نہیں ہوتی ہیں چونکہ اس کی علامات زیادہ واضح نہیں ہوتی اس لیے بارش کے موسم میں یا ہوا میں زیادہ نمی ہونے کی صورت میں پھپھوند کش دوا کا اسپرے کر دینا چاہیئے۔



روئیں دار پھپھوندی سے متاثرہ پودے

- نواٹس دوطاقتور اور پیدز ہروں کا مرکب۔
- نواٹس پودوں میں مکمل سرائیت پذیر ہونے کی صلاحیت۔
- نواٹس تیز مکمل اور زہر پاشی حفاظت۔
- نواٹس حفاظتی، معالجاتی اور بیماریوں کے خاتمے کی بہترین صلاحیت۔
- نواٹس روئیں دار پھپھوندی کے ساتھ آفٹر کروز اور سفونی پھپھوندی کیلئے بھی کارگر۔

سفارشات برائے استعمال

مسئلہ	حل	دوا کی مقدار	وقت استعمال
روئیں دار، سفونی پھپھوندی	نواٹس	250 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی میں	ہوا میں زیادہ نمی یا بیماری کی علامات نظر آنے پر

2- سفونی پھپھوندی: (Powdery Mildew)

اس بیماری کا حملہ گرم اور خشک موسم میں ہوتا ہے۔ اس بیماری کے پھیلاؤ کیلئے 25-35 ڈیگری درجہ حرارت اور ہوا میں نمی کی مقدار 50 فیصد سا زگار حالات پیدا کرتی ہے۔ حملہ کی صورت میں سفید رنگ کا سفوف پتوں اور شاخوں پر نظر آتا ہے یہ بیماری ہوا اور تیلہ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔

سفونی پھپھوندی کا انسداد:

نواٹس الٹرا™ 40 فیصد بایو پی



سفونی پھپھوندی سے متاثرہ پودے

- نواٹس الٹرا شدید موسمی حالات میں کارگر۔
- نواٹس الٹرا فصل پر ٹھنڈا اور صحت مند اثرات
- نواٹس الٹرا پودے میں سرائیت پذیر ہونے کی وجہ سے مکمل اور زہر پاشی حفاظت
- نواٹس الٹرا حفاظتی اور معالجاتی جیسی بہترین صلاحیت

سفارشات برائے استعمال

مسئلہ	حل	دوا کی مقدار	وقت استعمال
سفونی پھپھوندی	نواٹس الٹرا	250 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی میں	بیماری کے نمونوں میں یا علامات نظر آنے پر

جڑ اور تنے کا گھاؤ (Damping Off):

یہ بیماری زیادہ درجہ حرارت اور نمی کی وجہ سے تیزی سے پھیلتی ہے۔ چھوٹے پودوں پر حملہ کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں فصل کو پانی لگانے پر یہ بیماری آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔



جڑ اور تنے کا گھاؤ سے متاثرہ پودے

خربوز اور تربوز کی کاشت

خربوز اور تربوز کے اعلیٰ معیار اور زیادہ پیداوار کیلئے **سانیاں** انٹرنیشنل کی پیداواری ٹیکنالوجی۔

خربوز اور تربوز کی منافع بخش کاشت:

خربوز اور تربوز گرمیوں کی اہم لذیذ اور منافع بخش فصلیں ہیں۔ غذائیت کے اعتبار سے دونوں میں وٹامن A, B, C اور منرلز اور مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بیج بھی مختلف بیماریوں کے خلاف طبی تاثیر رکھتے ہیں۔

خربوز اور تربوز کیلئے بہترین آب و ہوا:

خربوز اور تربوز کی کاشت میدانی علاقوں میں کی جاتی ہے۔ یہ 21 سے 38 سنٹی گریڈ درجہ حرارت تک کاشت کئے جاتے ہیں۔ ان کی مٹھاس میں گرم اور خشک موسم ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کاشت کے بعد بارشیں ہو جائیں اور ہوائیں نمی کی مقدار بڑھ جائے تو پودوں اور پھل پر بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جو کہ نہ صرف پھل کی کوئی پراثر انداز ہوتی ہیں بلکہ اس کی مٹھاس کو بھی کم کرتی ہیں۔ خربوز اور تربوز کو کئی علاقوں میں کم اونچی ٹنلوں میں بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے جو موسمی فصل سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں اور کسان کو زیادہ اچھا ریٹ مل جاتا ہے۔

زمین کی زرخیزی:

خربوز اور تربوز زرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کسی قسم کا کلر وغیرہ نہ ہو۔ اور نہ ہی اس زمین میں پانی کھڑا ہوتا ہے۔ میرا اور میرا بچتی زمین ان کے لئے سوزوں ہے جس کا تعامل 7.5 سے کم ہو۔ ہماری زمینوں میں نامیاتی مادہ کی بہت کمی ہے لہذا ضروری ہے کہ کم از کم 2 ٹری گلی سڑی گوبر کی کھاد فی ایکڑ کے حساب سے ڈالی جائے۔ اگر وقت ہو تو بجائی کے دو ماہ پہلے گوبر کی کھاد ڈال کر پانی لگا دیا جائے تاکہ یہ بہتر گل جائے۔

خربوز اور تربوز کے لئے غذائی ضروریات:

خربوز اور تربوز ایسی فصلیں ہیں جنہوں نے تھوڑے عرصے میں ایسے پھل پیدا کرنے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ شوگرز (کاربوہائیڈریٹس) ہوتے ہیں لہذا پودے کو زیادہ توانائی چاہیے ہوتی ہے جس کے لئے پودے کو زیادہ غذائی عناصر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی بجائی اب ٹنلوں میں بھی عام ہو رہی ہے جس سے کاشت کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں لہذا زیادہ پیداواری ان اخراجات کو پورا کر کے اچھا منافع دے سکتی ہے جو صرف پودے کو بہتر اور متوازن غذائی عناصر کی صورت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔

سانیاں انٹرنیشنل نے موسمی اور غیر موسمی خربوز اور تربوز کی کاشت اور ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مندرجہ ذیل پروگرام دیا ہے۔ جس سے بہت اچھی فی ایکڑ پیداوار حاصل ہوگی۔ ان غذائی عناصر میں اجزاء کبیرہ (میکرو نیوٹریٹس)، اجزاء صغیرہ (ماکرو نیوٹریٹس)، گروتھ ہارمونز، امائنو ایسڈز وغیرہ شامل ہیں۔

وقت کاشت:

اگنی کاشت: اگنی فصل لینے کیلئے کاشت وسط اکتوبر سے نومبر تک مکمل کر لینی چاہیے۔

موسمی کاشت: خربوز اور تربوز کی عام فصل کی کاشت کیلئے فروری اور مارچ موزوں موسم ہیں۔

بیج کا انتخاب: اچھی پیداوار کیلئے بیماریوں سے پاک، صحت مند اور اعلیٰ اقسام کے بیج منتخب کریں۔

فصل کی غذائی ضروریات کیلئے کھادوں کا مناسب اور متوازن استعمال:

چارجر

پاکستان کی زیادہ تر زمینوں کا تعامل 7.5 سے زیادہ ہونے کی وجہ سے پودوں کو مصنوعی کھادوں سے فاسفورس کی فراہمی لگاتار نہیں ہوتی کیونکہ کھاد ڈالنے کے کچھ ہی دنوں بعد فاسفورس زمین میں منجمد (Fix) ہو جاتی ہے جو پودے حاصل نہیں کر سکتے۔ **چارجر** ایک ایسی فاسفورس کھاد ہے جس میں فاسفورس کو نامیاتی عناصر کے ساتھ لاکھوں خاص قسم کے جراثیموں کی موجودگی میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ جراثیم چارجر کی فاسفورس کو پودوں کے لئے لگاتار فراہم کرنے کا باعث بنتے ہیں اور ایسے ہارمونز خارج کرتے ہیں جو پودوں کی صحت کو برقرار رکھتے اور بڑھوتری تیز کرتے ہیں۔ **چارجر** میں موجود خاص قسم کے نامیاتی عناصر زمین میں نمی برقرار رکھتے ہیں اور زمین میں موجود دوسرے اجزاء صغیرہ مثلاً زنک، آئرن، منیگیز، کاپر اور بوران کی فراہمی بہتر کرتے ہیں۔

فوائد: ● **چارجر** میں موجود فاسفورس فصل اُگنے سے لے کر پکنے تک ہر مرحلے پر دستیاب۔

● اساسی زمینوں میں بھی فاسفورس انجماد (P-Fixation) سے محفوظ۔



● حیاتیاتی اور نامیاتی خصوصیات کی وجہ سے زیادہ موثر۔

● فاسفورس کی لگاتار فراہمی کے باعث تربوز اور خربوز بڑے اور پیداوار زیادہ۔

سفارشات برائے استعمال

موسمی کاشت	چارجر	یوریا	ڈی اے پی	وقت اور طریقہ استعمال
	2 بیگ	1 بیگ	1 بیگ	بجائی کے وقت
	1 بیگ	1 بیگ	—	پہلے پانی کے ساتھ
ٹنلوں میں کاشت	چارجر	یوریا	ڈی اے پی	وقت اور طریقہ استعمال
	1 بیگ	1 بیگ	1 بیگ	بجائی کے وقت
	2 بیگ	1 بیگ	—	شاہراہ پر اترنے کے بعد

چارجر کو ڈرم میں حل کر کے پانی کے ساتھ فیلڈ کر سکتے ہیں۔

لاجواب

لاجواب اجزاء صغیرہ زنک، آئرن، منیگیز، بوران اور ایک خاص مرکب پر مشتمل پراڈکٹ

ہے۔ جب پودوں میں پھول لگ رہے ہوتے ہیں اس وقت اجزاء صغیرہ کی اہمیت بہت زیادہ

ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کسی ایک کی بھی کمی ہونے کی صورت میں پھولوں کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے

یا پھول گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ **لاجواب** کا سپرے اجزاء صغیرہ کی دستیابی برقرار رکھتا ہے۔

فوائد:

● خوراک سازی کا عمل تیز کرتا ہے۔ ● ایک خاص مرکب کی موجودگی میں پودے موسمی شدت کو برداشت کرتے ہیں۔

● وائرس پھپھوندی اور کیڑے مکوڑوں کا حملہ کم ہوتا ہے۔ ● پھولوں سے پھل سازی کا عمل زیادہ ہوتا ہے۔

● پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	مقدار فی ایکڑ	وقت اور طریقہ استعمال
خربوز یا تربوز	1 کلوگرام فی 100 لٹر پانی	پودوں میں جب پھول آنے شروع ہو جائیں۔

سانیاں پوش

پودوں کو بہتر نشوونما کے لئے نائٹروجن اور فاسفورس کے بعد پوناش کی بہت ضرورت ہوتی ہے

خصوصی طور پر خربوز اور تربوز جیسی فصلیں جنہوں نے مٹھاس زیادہ پیدا کرنی ہوتی ہے۔ پوناش کا استعمال

بہت اہم ہوتا ہے۔

سانیاں پوش 30 فیصد سے زیادہ پوناش کے ساتھ اضافی نائٹروجن، فاسفورس اور اصلاح کار کی وجہ سے خوراک

اجزاء کی اثر پذیریری میں اضافہ۔

سانیاں پوش کی تمام پوناش بہترین حالت میں دستیاب۔

فوائد:

● پھول صحت مند اور تولیدی عمل زیادہ۔ ● خربوز اور تربوز چمکدار اور صحت مند۔

● خربوز اور تربوز میں مٹھاس زیادہ۔ ● خربوز اور تربوز بڑے اور پیداوار زیادہ۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	مقدار فی ایکڑ	وقت اور طریقہ استعمال
خربوز یا تربوز	4 لٹر	پھول شروع ہونے پر نکلے پر پانی کے ساتھ ملا کر قطرہ قطرہ استعمال کریں

زینیکا / زینیکا ایکسٹرا™



ہماری زمینوں میں اجزاء کبیرہ نائٹروجن، فاسفورس اور پوناش کے ساتھ

ساتھ اجزاء صغیرہ زنک، آئرن، منیگیز، کاپر اور بوران کی بھی کمی واقع ہوگی

ہے۔ زمین کے زیادہ تعامل نے اس کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔

تمام اجزاء صغیرہ کا پودوں کی بڑھوتری اور خوراک سازی میں بہت اہم

کردار ہے۔ **سانیاں** انٹرنیشنل نے **زینیکا / زینیکا ایکسٹرا**

کے ایک خاص حصے کو چیمائیڈ (Chelated) کیا ہے جس کی وجہ سے زنک، آئرن، منیگیز، بوران زمین میں ڈالنے کے بعد

متوازن حالت میں پودوں کو لگاتار فراہم رہتے ہیں۔

فوائد:

● پودوں کا زیادہ عرصہ تک سرسبز و شاداب رہنا۔ ● نئی پھوٹ کا زیادہ تیزی سے آنا۔

● خوراک سازی کا عمل تیز۔ ● جڑوں کی بڑھوتری میں اضافہ۔

● سی شیلڈ ٹیکنالوجی (Chelation) کے باعث متوازن دستیابی۔

● پھولوں اور پھلوں کی تعداد میں اضافہ اور زیادہ پیداوار۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	محل	مقدار فی ایکڑ	وقت اور طریقہ استعمال
خربوز یا تربوز	زینیکا 10 لٹریٹ	3 لٹر	بجائی کے بعد دوسرے پانی کے ساتھ گنے قطرہ قطرہ ملائیں۔
خربوز یا تربوز	زینیکا ایکسٹرا	4 گلوگرام	بجائی کے بعد پہلے پانی کے ساتھ چھو کریں۔

گرو-اپ™

ہماری زمینوں کے کلراٹھے پن اور تعامل زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین میں ڈالی گئی کھادیں عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہیں اور

استعمال کارکردگی کم ہو جاتی ہے۔ **گرو-اپ** کا سپرے اس کی کو پورا کر کے پودوں کو سرسبز رکھتا ہے۔

فوائد:

● پودے کی جڑوں اور شاخوں کی بڑھوتری۔ ● پھول زیادہ اور پھل صحت مند اور بڑے۔

● پتے چوڑے اور صحت مند۔ ● خربوز اور تربوز کی کوئی بہتر اور پیداوار میں اضافہ۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	مقدار فی ایکڑ	وقت اور طریقہ استعمال
خربوز یا تربوز	500 گرام 100 لٹر پانی میں	پودے اگنے کے 30 دن بعد پہلا سپرے پھول آنے پر دوسرا سپرے

بائیوٹاک™

بائیوٹاک™ ایسا بائیو مرکب ہے جو پودوں کو فائدہ پہنچانے والے ایسے عناصر اور جراثیموں پر مشتمل ہے۔ جو پودوں کو پھپھوند

سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ پودوں کے خوراک کی اجزاء کی کارکردگی بڑھاتا اور پودوں پر منفی ماحولیاتی عوامل کو کم کرتا ہے۔

بائیوٹاک کے فی گرام میں 10 کروڑ سے زیادہ ایسے خوردبینی جاندار (جراثیم) ڈالے گئے ہیں جو بہترین پھپھوند کش

اثرات رکھتے ہیں۔ پودے کی بڑھوتری کو تیز کرنے والے ہارمونز (PGRs) ڈالے گئے ہیں جو خربوز اور تربوز کی شاخوں

اور جڑوں کو بڑھاتے ہیں۔

بائیوٹاک™ متعدد پھپھوند والی بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے۔

بائیوٹاک™ پھولوں کی تعداد زیادہ کرتا ہے اور خربوز اور تربوز کا سائز بڑا کرتا ہے۔

