


پیاز

پیداواری پروگرام



سائبان زرعی مرکز پرستیاب



پیلا روگ (Downy Mildew)

ہوائیں کی تناسب زیادہ ہونے سے بیماری کا حملہ بڑھ جاتا ہے۔ پتوں پر ہلکے سبز رنگی مائل دھبے نمودار ہوتے ہیں اور پھول کی ڈنڈی پر جامی پچھوند نمایاں ہوتی ہے۔



ڈیگر™
نیز 1.9

ڈیگر 1.9 نیز اسی جدید پریچ پتی امریکن سنڈی کے موثر کنٹرول کے لئے ایک منفرد نیکی ستری کی رنگی دوا ہے۔ اس کا اصل زہر ایماکلن نیزیٹ جو کقدر تی بیکیش یا سترپو ماسس ایورینیکس (Streptomyces evermitilis) کے فنٹیش طریقہ (Fermentation Process) سے حاصل کیا گیا ہے۔

- کھانے و چونے سے فوری اثر۔
- سنڈیوں کے کھانے کی صلاحیت محفوظ (منفاذ خودہ)۔
- دوست کیڑے محفوظ۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	تجویز	مقدار فلوج ایکٹر
ڈیگر	ڈیگر	200 ملی لیٹر فلوج ایکٹر



سٹروک (Stink)

دنیا بھر میں سنڈیوں کے کنٹرول کیلئے یہ آزمودہ زہر ہے۔ اس کا اصل زہر لیفنیوران (Lufenuron) ہے۔ ایماکلن یوریگروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ سٹروک اپنے منفرد طریقہ اثر کے باعث سنڈیوں کو ایک سے دوسرا حالت میں نہیں جانے دیتا اور سنڈیاں مر جاتی ہیں۔

- سنڈیوں میں جلد بننے کے عمل کو روک دیتا ہے۔
- پیاز کی فصل انکری سنڈی کے شر سے محفوظ۔
- دوست کیڑے محفوظ۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	تجویز	مقدار فلوج ایکٹر
سٹروک	سٹروک	200 ملی لیٹر فلوج ایکٹر

مزید معلومات اور رہنمائی کیلئے اپنے قربی سائبان زرعی مرکز سے رابطہ کریں۔

برائے رابطہ:

0301-8488142	0301-8488647	0301-3568369
0302-8476389	0300-0402673	0301-8488643
0307-4443522	0307-4443071	0307-4443260

سائبان انٹرنیشنل 62 کلومیٹر میان روڈ، روہی نالہ، پھول مگر، لاہور۔

Ph:049-4388444-6, 0300-0444894

Web: <https://www.saybangroup.com>

saybangroup



بولٹ™
ایک جدید کیمیاء ہے جو کرس چونے والے کیڑے اور سنڈیوں (انکری سنڈی) کے خلاف بیک وقت موثر ہے۔

- بولٹ کھانے اور چونے دونوں عوامل کے ذریعہ اثر کرتا ہے۔
- تھرپس (بلیک و براؤن) پروفی اثر۔
- دوست کیڑوں پر محفوظ۔
- دیر پاٹر

سفارشات برائے استعمال

فصل	تجویز	مقدار فلوج ایکٹر
بولٹ	بولٹ	100 ملی لیٹر فلوج ایکٹر

بونٹ (Bonut)

- بونٹ دوچھوند کش زہروں میں لکسل اور میکروزیب کا ماق تو مرکب ہے۔
- بونٹ خاطقی اور معالجی طریقے سے اثر کرتا ہے۔

بونٹ پتوں پر ایک خاطقی تہہ بناتا ہے اور پچھوند کو پتوں میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	مسک	تجویز	سفارشات
پیاز	پیلاروگ	بونٹ	250 گرام فلوج ایکٹر

ویلڈن (Welldone)

ویلڈن پیاز و سبزیات میں بیماریوں کے خلاف مریوط نظام Disease Resistance Management کے اصولوں پر بنایا گیا جدید کیمیاء ہے۔

طریقہ اثر:

- چھپوندی کے خلیوں کی بیرونی محلی بنیت سے روکتا ہے۔
- خاطقی و معالجی طریقہ اثر کرتا ہے۔

فواکد: ویلڈن کے خصوصی طریقہ اثر سے پتوں پر ایک چکدار خاطقی تہہ واضح نظر آتی ہے۔

- ویلڈن میں موجود Zn کا غصہ پوڈے کی بڑھتی میں تیزی لاتا ہے۔
- ویلڈن سے پیاز چکدار۔
- ویلڈن پھل اور دوست کیڑوں پر محفوظ ہے۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	تجویز	مقدار فلوج ایکٹر
پیاز	ویلڈن	350 گرام فلوج ایکٹر

گلِمَر (Glimmer)

گلِمَر 70 گیلوپ و سمع الاثر سرایت پذیر پچھوند کش دوا ہے۔ اس کا اصل زہر خاطقی اور معالجی دو توں طرح کی خصوصیات کا حامل ہے اس لئے مختلف بیماریوں کے محلے سے پہلے اور بعد دو توں ہی صورتوں میں مکمل اور دیر پاٹھفراہم کرتا ہے۔

فصل	سے	تجویز	سفارشات
پیاز	گلِمَر	100 گرام فلوج ایکٹر	پیاز کا مرچا، پیاز کا مرچا

پیاز کی کاشت

پیاز کے اعلیٰ معیار اور زیادہ پیداوار کیلئے سائنس اندر نیشنل کی پیداواری شکناوی۔

پیاز کی منافع بخش کاشت:

پیاز دنیا کی قدیم ترین بزرگیات میں سے ایک ہے جو قریبًا ہر سال میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال دن بدن بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ دل کے امراض کے لئے مفید بلکہ خون کی شریانوں میں بھی ہوئی چربی ہمی کو لیسٹروں کو تخلی کرتا ہے اور ببلہ پر بشر سے محفوظ رکھتا ہے۔

پیاز ایسی فصل ہے جو بغیر اضافی اخراجات کے ستر کاشت گئے میں کھلیوں کے دونوں طرف کاشت کی جاسکتی ہے۔ اسی کاشت سے گنے کی پیداوار غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے اور **پیاز** کی پیداوار بھی بہت بہتر ہوتی ہے۔

آب و ہوا

پیاز بنادر میانے اور مختینے موسم کی فصل ہے۔ اچھی نشومنا کے لئے 2015ء گری سینٹی گرینی اور گلھس بنتے وقت 18-25 گری سینٹی گرینی موزوں ترین ہے۔

تیج کی مقدار

2 سے 3 کلو اچاق (4 تا 5 مرلزین) کی نرسی ایک بلکھیت میں استعمال کے لیے موزوں ترین ہے۔ 6-7 ہفتے عمر کی بیجی کھیت میں منتقل کرنی چاہیے۔

زمین کی زرخیزی:

پیاز کو زرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کسی قسم کا کلروغیرہ نہ ہو۔ اور نہ ہی اس زمین میں پانی کھڑا ہوتا ہے۔ میرا اور چکنی میرا زمین ان کے لئے موزوں ہے جو کا تعالیٰ 7.5 سے کم ہو۔ ہماری زمینوں میں نامیانی مادہ کی بہت کمی ہے لہنہ ضروری ہے کہ کم از کم 2 ٹرالی گلی سری گور کی کھادی ایکڑ کے حاب سے ڈالی جائے۔ اگر وقت ہوتے جائی کے دو ماہ پہلے گور کی کھادی ڈال کر پانی کا دیا جائے تو کہہ بہتر گل جائے۔

وقت کاشت:

وقت کاشت	علاقوں جات	بنیادی اگانے کا وقت
پنجاب (میدانی علاقہ)	اکتوبر، نومبر	پنجاب (میدانی علاقہ)
پنجاب (پہاڑی علاقہ)	مارچ، اپریل	پنجاب (پہاڑی علاقہ)
سندھ (زیریں علاقہ)	جولائی، اگست	سندھ (زیریں علاقہ)
سندھ (بالائی علاقہ)	اکتوبر	سندھ (بالائی علاقہ)
خیبر پختونخواہ	اکتوبر، نومبر	خیبر پختونخواہ
بلوچستان (میدانی علاقہ)	دسمبر، جنوری	بلوچستان (میدانی علاقہ)
(یہیں مختینے ملتوں نوژوی اور چکنے کے لئے بھی میرا جائیں ہے)		

فصل کی غذائی ضروریات کیلئے کھادوں کا مناسب اور متوازن استعمال:

چارجر فاسفورس + نامیانی مادہ + گروچر گیو لیٹر ز + فائدہ مندرجہ ذیل ہے

پاکستان کی زیادہ تر زمینوں کا تعالیٰ 7.5 سے زیادہ ہونے کی وجہ سے پودوں کو مصنوعی کھادوں سے فاسفورس کی فراہمی لگاتا نہیں ہوتی

کیونکہ کھادوں کے کچھ ہی دونوں بعد فاسفورس زمین میں نجد (Fix) ہو جاتی ہے جو پودے حاصل نہیں کر سکتے۔ **چارجر** ایسی

فاسفورس کی خاصیت ہے جس میں فاسفورس کو نامیانی عناصر کے ساتھ لاکھوں خاص قسم کے باروں میں موجود ہو گی میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ جو شوے

چارجر جی کی فاسفورس کو پودوں کے لئے لگاتار فراہم کرنے کا باعث بنتے ہیں اور اسے ہار موزخارج کرتے ہیں جو پودوں کی محنت کو برقرار کھتے اور بڑھوڑتی نہیں کرتے ہیں۔ **چارجر** میں موجود خاص قسم کے نامیانی عناصر میں نبی پر برقرار کھتے ہیں اور زمین میں موجود دوسرے اجزائے صمیرہ مٹا زک، آرزن، مینگنیز، کاپر اور بوران کی بھی واقع ہو گئی

اجڑے صمیرہ مٹا زک، آرزن، مینگنیز، کاپر اور بوران کی فراہمی بہتر کرتے ہیں۔

فونک ایسی زمینوں میں بھی فاسفورس انجگاد (P-Fixation) سے محفوظ

چارجر میں موجود فاسفورس فصل اگنے سے لے کر کنٹک ہر مرطے پر دستیاب۔

جیسا تائی اور نامیانی مادہ ضائع ہونے سے محفوظ

فاسفورس کی لگاتار فراہمی کے باعث **پیاز** بڑے اور پیداوار زیادہ۔

سفارشات برائے استعمال

چارجر	ساتوبونیم	وقت اور طریقہ استعمال	ڈی اے پی	ساتوبونیم
2 بیگ	1 بیگ	بھائی کے دن	1/2 بیگ	بھائی کے دن
-	-	15 دن کے بعد	1 بیگ	-

ساتوبونیم امونیکل ناٹرو جن کھاد ہے جس میں 21 فیصد ناٹرو جن کے ساتھ اضافی طور پر 24 فیصد سلفری طاقت موجود ہے۔

چارجر کو ساتوبونیم کے ساتھ ڈرم میں حل کر کے پانی کے ساتھ فلڈ کر سکتے ہیں۔

وایٹل

پودوں کو فوری طور پر توانائی فراہم کرنے کے لیے ایک اہم طاقتور اجزائی مرکب ہے جس میں اجزائے کمیرہ کے ساتھ اضافی طور پر گروچر گیو لیٹر خاص تناسب میں ڈالے گئے ہیں۔

فونک وایٹل پودوں کی بڑھوڑتی میں اضافہ کرتا ہے۔

وایٹل پوچ سے بلب کی طرف خوراک کی تسلیم تیز کرتا ہے۔

وایٹل پیاز کا وزن زیادہ کر کے پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔

سفارشات برائے استعمال

وقت طریقہ استعمال	مقدار فرنی ایکڑ	فصل
پنیری منتقلی کے 15 دن کے بعد پرے کریں۔	1 لیٹر 80 لیٹر پانی میں	پیاز

سائیان پوش پوچاں + ناٹرو جن + فاسفورس + زمینی اصلاح کار

پودوں کو بہتر نشومنا کے لئے ناٹرو جن اور فاسفورس کے بعد پوچاں کی بہت ضرورت ہوتی ہے خصوصی طور پر **پیاز** کی فصل جس نے زمین کے اندر بلب میں خوراک زیادہ کرنا ہوتی ہے۔ پوچاں کا استعمال بہت اہم ہوتا ہے۔

سائیان پوش 30 فیصد سے زیادہ پوچاں کے ساتھ اضافی ناٹرو جن، فاسفورس اور اصلاح کار کی وجہ سے خوراکی اجزاء کی اثر پذیری میں اضافہ۔

سائیان پوش کی تمام پوچاں بہترین حالت میں دستیاب۔

فونک پیاریوں سے محفوظ

پیاز چمکدار اور صحبت مند۔

سفارشات برائے استعمال

وقت اور طریقہ استعمال	مقدار فرنی ایکڑ	فصل
پنیری منتقلی کے 20 دن بعد کے پرانی کے ساتھ ملا کر قطرہ قطرہ استعمال کریں	4 لیٹر	پیاز

زینیکا / زینیکا ایکسٹرا

ہماری زمینوں میں اجزائے کچھ ناٹرو جن، فاسفورس اور پوچاں کے ساتھ ساتھ اجزائے صغیرہ زمک، آرزن، مینگنیز، کاپر اور بوران کی بھی واقع ہو گئی ہے۔ زمین کے زیادہ تعالیٰ نے اس کی کشیدت میں اضافہ کر دیا ہے۔

تمام اجزائے صغیرہ کا پودوں کی بڑھوڑتی اور خوراک سازی میں بہت اہم کردار ہے۔ **سائیان اندر نیشنل نے زینیکا / زینیکا ایکسٹرا**

کے ایک خاص حصہ کو جیلیٹ (Chelated) کیا ہے جس کی وجہ سے زمک، آرزن، مینگنیز، بوران زمین میں ڈالنے کے بعد متوازن حالت میں پودوں کو لگاتار فراہم رہتے ہیں۔

سفارشات برائے استعمال

وقت اور طریقہ استعمال	مقدار فرنی ایکڑ	فصل
بھائی کے دن	600 میلی لیٹر فرنی ایکڑ	پیاز

اوپل

اوپل 10.8 فرنی ایکڑ

اوپل (IGR) گروپ سے تعاقب رکھنے والا جدید کیمیاء ہے۔ **اوپل** سفید کھی میں چھوٹے اور رس چو سنے کے عمل سے داغ ہوتا ہے۔

سفید کھی میں اٹھے دینے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔

سفید کھی کے پچھے اگلی حالت میں منتقل نہیں ہو پاتے۔

نوٹ: 7 دن کے وقفہ سے دا سپر کے کریں۔

سفارشات برائے استعمال

مقدار فرنی ایکڑ	تجویز	فصل
600 میلی لیٹر فرنی ایکڑ	اوپل	پیاز

اوپل

اوپل 10.8 فرنی ایکڑ

(IGR) گروپ سے تعاقب رکھنے والا جدید کیمیاء ہے۔ **اوپل** سفید کھی میں چھوٹے اور رس چو سنے کے عمل سے داغ ہوتا ہے۔

سفید کھی میں اٹھے دینے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔

سفید کھی کے پچھے اگلی حالت میں منتقل نہیں ہو پاتے۔

نوٹ: 7 دن کے وقفہ سے دا سپر کے کریں۔

سفارشات برائے استعمال

مقدار فرنی ایکڑ	تجویز	فصل
250 میلی لیٹر فرنی ایکڑ	اوپل	پیاز